

***Platypleura frontalis*,**
eine neue Singzikade von Sumatra.

(*Rhynchota Homoptera*.)

Von Edmund Schmidt, Stettin.

Fam. *Cicadidae*.
 Subfam. *Cicadinae*.
 Tribus *Platypleurini*.

Genus *Platypleura* Am. et Serv.

Hist. Hém. p. 465 (1843); Dist. Cat. Hom. Part I. Cicadidae,
 p. 5 (1906).

Typus: *Platypleura stridula* L.

***Platypleura frontalis* n. sp.**

♂♂, ♀♀. Diese Art steht der *Pl. nobilis* Germ. von Java sehr nahe und kann mit ihr leicht verwechselt werden, besonders wenn die Flügel nicht ausgebreitet sind. Von genannter Art unterscheidet sie sich dadurch, daß im Hinterflügel die schwarze Färbung fast bis an die Umfangader reicht und 9 Apicalzellen vorhanden sind — bei *Nobilis* ist das Apicaldrittel hyalin und es sind 8 Apicalzellen vorhanden.

Von *Pl. Kaempferi* F. unterscheidet sie sich in der Größe, der Zeichnung der Vorderflügel und der Stirnbildung. Die neue Art ist kleiner, die Vorderflügel sind wie bei *Nobilis* gefärbt, und die Mittelfurche der Stirnfläche ist $2\frac{1}{2}$ mal so lang als an der breitesten Stelle breit, am breitesten etwas oberhalb der Stirnmitte; die verdickten Seitenränder der Stirnfurche verlaufen zum Clipeus und zum Stirnoberrand convergierend — bei *Kaempferi* ist die Stirnfurche 5 bis 6 mal so lang als breit und überall gleich breit. Körperfärbung und Zeichnung wie bei *Nobilis*.

♂♂. Letztes Bauchsegment vor der Subgenitalplatte an der Basis etwas breiter als in der Mitte lang mit abgerundetem Apicalteil, länger als die Subgenitalplatte. Subgenitalplatte länger als an der Basis breit, mit einem Mittelkiel.

♀♀. Letztes Bauchsegment vor der Legescheide mit einem runden Ausschnitt in der Mitte.

♂♂, ♀♀. Länge des Körpers 16 bis 18 mm; Länge mit den Vorderflügeln 28 bis 30 mm.

Sumatra, Soekaranda (Dr. H. Dohrn).

Typen im Stettiner Museum.